

Małgorzata Konarska

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Niepubliczny Zakład Medycyna Rodzinna s.c.

05-600 Grójec, ul. Olimpijska 8, tel. 48 6642288, e-mail: mtkonarska@onet.pl

Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki w gabinetach zabiegowych podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwach: Zomikos, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, Pamifos, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji

Produkt leczniczy Zomikos, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji należy do grupy tzw. „leków wymagających” i zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego **może być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w dożylnym podawaniu leków z grupy bisfosfonianów**. Zapis ten wyklucza możliwość podawania preparatu przez pielęgniarki oraz lekarzy nie posiadających doświadczenia w zakresie podawania dożylnego bisfosfonianów.

W charakterystykach dotyczących innych produktów leczniczych z tej grupy mogą mieć zastosowanie łagodniejsze zapisy dotyczące ich podawania przez osoby wykwalifikowane / pielęgniarki / pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w podawaniu leku. Dożylne podawanie kwasu zoledronowego wymaga wstępnej kwalifikacji pacjenta do terapii, oraz monitorowania jego stanu podczas leczenia (monitorowania u pacjentów w surowicy krwi poziomu kreatyniny, wapnia, fosforanów i magnezu, stanu nawodnienia). Z uwagi na farmakokinetykę infuzji kwasu zoledronowego (stężenie substancji aktywnej w osoczu pacjenta) monitorowanie to powinno odbywać się w trakcie wlewu, oraz po jego zakończeniu maksymalnie do 4 godzin licząc od momentu rozpoczęcia wlewu. W przypadku wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii konieczne jest wprowadzenie krótkotrwałej terapii uzupełniającej. Zarówno monitorowanie podczas podawania leku jak i prowadzenie terapii uzupełniającej nie są możliwe w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Produkt leczniczy Pamifos, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji może być na zlecenie lekarskie podawany przez pielęgniarki zgodnie z zasadami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego, jednak należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed podaniem produktu leczniczego Pamifos należy skontrolować wydolność nerek pacjenta, stan nawodnienia, odpowiednio pacjenta nawodnić, na bieżąco kontrolować stan

nawodnienia, po rozpoczęciu podawania należy monitorować wskaźniki metaboliczne związane z hiperkalcemią i hipokalcemią (stężenie wapnia i fosforanów w surowicy krwi). Realizacja wyżej wymienionych zaleceń zawartych w charakterystyce produktu leczniczego dotyczących jego podawania nie jest możliwa w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie zabiegowym pielęgniarki/lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, organizację i specyfikę świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzam, że produkty lecznicze o nazwach:

Zomikos, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji

Pamifos, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji

nie mogą być podawane przez pielęgniarki w gabinetach pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Powyższa opinia została sporządzona na podstawie charakterystyk analizowanych produktów leczniczych, oraz stanowiska dr nauk farm. Leszka Borkowskiego Specjalisty II° z Analizy Leków, Pełnomocnika Dyrektora Szpitala Wolskiego ds. Analizy i Gospodarki Lekiem, Prezesa Fundacji Razem w Chorobie w przedmiotowej sprawie.

Grójec, 31 stycznia 2020

mgr Małgorzata Konarska
KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego